

Aviomarin tabl. 0.05g x 5 szt.



cena: 19,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,05 g
Kategoria	Lek
Opakowanie	5 tabl.
Postać	tabletki
Producent	Pliva Kraków
Substancja czynna	Dimenhydrinat (Dimenhydrinatum)
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

Wskazania do stosowania preparatu: wymioty, choroba lokomocyjna, zaburzenia błędnika, choroba Meniere'a, stany uczuleniowe, niektóre postacie migreny, stany skurczowe jelit; także w zapobieganiu wymiotom pooperacyjnym i w przyg

Skład:

1 tabl. zawiera 0,05 g dimenhydrinatu.

Działanie:

Lek o silnym działaniu przeciwwymiotnym. Działa depresyjnie na odruchy błędnikowe i ośrodek wymiotny. Ponadto wywiera działanie przeciwhistaminowe i spazmolityczne. Wywiera depresyjny wpływ na OUN.

Wskazania:

Wymioty, choroba lokomocyjna, zaburzenia błędnika, choroba Meniere'a, stany uczuleniowe, niektóre postacie migreny, stany skurczowe jelit; także w zapobieganiu wymiotom pooperacyjnym i w przygotowaniu do zabiegów chirurgicznych.

Przeciwwskazania:

Ciąża, laktacja, nadwrażliwość na lek, dzieci do 5 r.ż., padaczka, jaskra, ostra porfiria, ostre dermatozy wysiękowe i pęcherzowe.

Działania niepożądane:

Zmęczenie, ospałość, senność, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, niekiedy skórne reakcje uczuleniowe.

Interakcje:

Osłabia działanie kortykosteroidów, doustnych leków przeciwzakrzepowych, fenytoiny, guanetydyny; nasila działanie epinefryny i norepinefryny na układ sercowo - naczyniowy; w skojarzeniu z lekami przeciwbólowymi, psychotropowymi, rezerpiną, skopolaminą nasila się działanie uspokajające oraz ryzyko osłabienia wzroku (także ze związkami bizmutu); z tiordazyną - działanie przeciwcholinergiczne (zawroty głowy, dezorientacja). Nie stosować łącznie z lekami ototoksycznymi, nasercowymi, neuroleptykami, ataraktami.

Dawkowanie:

Tabletki:

Dorośli doustnie zapobiegawczo 0,05 g na 30 min przed podróżą lub narkozą (dawkę można podawać 3-4 razy na 24 h, ale nie częściej niż co 4 h); leczniczo 0,05 g 3-4 razy na 24 h.

Dzieci w zależności od wieku 0,025-0,1 g 2 razy dziennie.