

Filomag B6 (40 mg + 5 mg) 50 tabletek

cena: 11,30 PLN



Opis słownikowy

Dawka	40 mg + 5 mg
Kategoria	Lek
Opakowanie	50 tabletek
Postać	tabletki
Producent	Filofarm
Substancja czynna	Witamina B6 (Pirydoksyna)
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

Filomag B6 zawiera dobrze przyswajalny związek magnezu (asparaginian) oraz witaminę B6.

Skład:

1 tabletkę zawiera:

substancje czynne: 600 mg magnezu wodorasparaginianu (co odpowiada 40 mg jonów magnezu) oraz 5 mg pirydoksyny chlorowodoru

substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa, sacharoza, talk, magnezu stearynian

Jak stosować lek Filomag B6

Lek Filomag® B6 należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat podawania leku Filomag® B6:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

lecniczo:

1 do 2 tabletek 2 do 3 razy na dobę (maksymalnie 6 tabletek w ciągu doby)

tj. od 80 mg do 240 mg Mg/ dobę (3,3 mmol do 9,9 mmol);

od 10 mg do 30 mg witaminy B6 / dobę,

profilaktycznie, w uzasadnionych przypadkach:

1 do 2 tabletek 2 razy na dobę (maksymalnie 4 tabletki w ciągu doby)

tj. od 80 mg do 160 mg Mg/ dobę (3,3 mmol do 6,6 mmol);

od 10 mg do 20 mg witaminy B6 / dobę.

Dzieci w wieku od 4 do 12 lat:

odpowiednio do stwierdzonych niedoborów magnezu, wieku i masy ciała dziecka:

1 do 2 tabletek 2 razy na dobę (maksymalnie 4 tabletki w ciągu doby)

tj. od 80 mg do 160 mg Mg/ dobę (3,3 mmol do 6,6 mmol);
od 10 mg do 20 mg witaminy B6 / dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Filomag B6 jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Nie należy stosować leku Filomag B6 jeśli występuje:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu,
hipermagnezemia (nadmiar magnezu we krwi),
ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min),
zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok), bradykardia (zbyt wolna praca serca), myasthenia gravis (rzadka choroba, której towarzyszy zwiótczenie mięśni).

Zachować szczególną ostrożność stosując Filomag® B6, jeśli

- lek podawany jest przez długi okres.

Podczas długotrwałego stosowania należy kontrolować stężenie magnezu w surowicy krwi (lekarz zaleci wykonanie odpowiednich analiz).

- wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów.

Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie leku Filomag B6 u dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Stosowanie leku Filomag B6 u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Leku Filomag® B6 nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Stosowanie leku Filomag B6 u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmian sposobu podawania i dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Leku nie należy podawać jednocześnie z fosforanami i związkami wapnia, gdyż zmniejszają one wchłanianie magnezu. Sole magnezu zmniejszają wchłanianie niektórych antybiotyków, np. tetracyklin; należy zachować co najmniej 3-godzinną przerwę pomiędzy podaniem obu leków. Magnez zmniejsza wchłanianie związków żelaza, fluoru, fluorochinolonów oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny. Witamina B6 zmniejsza skuteczność preparatów lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy (leki stosowane w parkinsonizmie).

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Filomag® B6 może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek może spowodować zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (np. zmiany rytmu pracy serca). Niekiedy po stosowaniu leku mogą wystąpić nudności i biegunka, które zwykle ustępują samoistnie, a także zaczerwienienie skóry, bezsenność, osłabienie mięśniowe. U niektórych osób w czasie stosowania leku Filomag® B6 mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Przechowywanie leku Filomag® B6

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM

ul. Pułaskiego 39

85-619 Bydgoszcz